

Міністерство освіти і науки України
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ»
Навчально-науковий інститут харчових технологій
Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
з дисципліни
«ГОДІВЛЯ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН»

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності Н2 Тваринництво освітньо-професійна програма «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва» (204 «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва»)

м. Кам'янець-Подільський
2025

Міністерство освіти і науки України
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ»
Навчально-науковий інститут харчових технологій
Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
з дисципліни
«ГОДІВЛЯ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН»

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності Н2 Тваринництво освітньо-професійна програма «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва» (204 «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва»)

м. Кам'янець-Подільський
2025

Укладач:

ЄВСТАФІЄВА Юлія Миколаївна доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва, кандидат с.-г. наук

Методичні рекомендації рекомендовано до руку науково-методичною радою Закладу вищої освіти «Подільський державний університет (протокол № ____ від «____» _____ 2025 р.)

Рецензенти:

ГОРДІЙ Наталія Михайлівна старший викладач кафедри біології та екології, кандидат біологічних наук, доцент Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

КЕРНИЧНИЙ Сергій Петрович завідувач кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії, кандидат ветеринарних наук, доцент, Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

Євстафієва Ю.М. Тестові завдання з дисципліни «ГОДІВЛЯ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Н2 Тваринництво освітньо-професійна програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»). Кам'янець-Поділ.: Копі-центр, 2025. 52 с.

Тестові завдання орієнтовані на допомогу здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Н2 Тваринництво освітньо-професійна програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»).

РОЗДІЛ 1. ГОДІВЛЯ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

1. Раціони екзотичних тварин балансують за поживністю по:

- a) 15 елементами;
- b) 25-35 елементами;
- c) 18-40 елементами.

2. Під нормованою годівлею екзотичних тварин розуміють:

- a) годівлю, в якій кількість та якість корму, що отримує тварина, залежить від її віку, статі та фізіологічного стану;
- b) не допускати недогодування або перегодовування, що однаково шкідливо впливає на здоров'я недогодування або перегодовування, що однаково шкідливо впливає на здоров'я тварин та їх ріст.

3. Годувати за нормами означає:

- a) годівлю, в якій кількість та якість корму, що отримує тварина, залежить від її віку, статі та фізіологічного стану;
- b) не допускати недогодування або перегодовування, що однаково шкідливо впливає на здоров'я недогодування або перегодовування, що однаково шкідливо впливає на здоров'я тварин та їх ріст.

4. У самців при недостатній годівлі:

- a) припиняється сперматогенез;
- b) розладів травлення;
- c) стерильності самців;
- d) припинення вагітності.

5. У самок при недостатній годівлі:

- a) розладів травлення;
- b) стерильності самців;
- c) припинення вагітності;
- d) припиняється статевий цикл.

6. Хронічне недогодовування викликає зміни:

- a) шерстяного та пір'яного покриву тварин;
- b) розладів травлення;
- c) стерильності самців;
- d) припинення вагітності.

7. Надмірна годівлі призводить до:

- a) розладів травлення;
- b) стерильності самців;
- c) припинення вагітності;
- d) припиняється сперматогенез;
- e) облісіння;
- f) збільшення дихального коефіцієнту;
- g) підвищення потреби у воді.

8. Найважливіший елемент обліку, планування, раціонального використання кормових засобів годівлі тварин:

- a) кормова норма;
- b) умови утримання;

с) раціон.

9. При користуванні нормами слід враховувати:

- а) умови утримання;
- б) індивідуальні особливості;
- с) фізіологічний стан;
- д) погодні умови;
- е) живу масу.

10. Від правильного підбору кормів, їх поєднання і підготовки до згодовування, залежить їх:

- а) засвоєння;
- б) стан здоров'я тварин;
- с) наповнення травного тракту.

11. Надмірно об'ємні раціони, що містять неочищене, неподібне зерно (овес, ячмінь), висівки, погано впливають на стан тварин у:

- а) період гону;
- б) період вагітності;
- с) сезон року.

12. Годівля висококонцентрованими кормами без обліку об'єму корму небажана,, оскільки викликає:

- а) запори;
- б) проноси;
- с) розлади серцево-судинної системи.

13. Корми, що легко зброджуються, які не можна згодовувати одночасно з пекарськими дріжджами і зеленню:

- a) картопля;
- b) зерно пшениці;
- c) ягоди;
- d) фрукти;
- e) баштанні;
- f) зерно ячменю.

14. Корми, що послаблюють роботу шлунково-кишкового тракту:

- a) молоко;
- b) каша;
- c) риб'ячий жир;
- d) зерно пшениці;
- e) зерно ячменю;
- f) зелень;
- g) свіжу траву.

15. Корми, що мають закріплюючу дію:

- кісткове борошно;
- столовий буряк;
- сир;
- сіно.

16. Об'єм кормової суміші залежить від:

- e) кратності годівлі;
- f) недостатнього наповнення травного тракту;
- g) знижує перетравність поживних речовин раціону.

17. Дворазова годівля дорослих лисиць, порівняно з одноразовою призводить до:

- a) недостатнього наповнення травного тракту;
- b) знижує перетравність поживних речовин раціону;
- c) зниження апетиту.

18. Зелені корми містять:

- a) вітамін А;
- b) вітамін Д;
- c) вітамін Е;
- d) вітамін Ф;
- e) вітамін В₁;
- f) вітамін В₂.

19. Зелені корми містять наступні мінеральні речовини у формі, що легко засвоюються:

- a) кальцій;
- b) фосфор;
- c) магній;
- d) марганець;
- e) каротин;
- f) залізо;
- g) мідь.

20. Влітку для годівлі травоядних екзотичних тварин основою є:

- a) зелені корми;
- b) грубі корми.

21. На поживну цінність зелених кормів впливають:

- a) ґрунти;
- b) кліматичні умови;
- c) агротехнічні заходи;
- d) сезон року.

22. Джерелом цінного, багатого білком корму є:

- a) багаторічні трави луків і пасовищ;
- b) кальцій;
- c) фосфор.

23. Здуття шлунку у екзотичних тварин викликають:

- a) молоді рослини конюшини і люцерни;
- b) вико-вівсяна суміш.

24. В якості зеленого корму використовують суміші рослин:

- a) вико-вівсяна;
- b) молоді рослини конюшини і люцерни;
- c) горохово-вівсяна.

25. Згодовування бобово-злакових сумішей слонам, коням і поні викликає:

- a) коліки;
- b) запори.

26. Забруднені корми викликають у тварин:

- a) проноси;
- b) коліки;
- c) загострення хвороб шлунку.

27. Отруйні рослини, що можуть міститися у кормах:

- a) болотний хвощ;
- b) адоніс;
- c) ромашка;
- d) жовтень отруйний;
- e) нагітки;
- f) молочай.

28. Перехід із зимових раціонів на літні триває:

- a) 8-10 днів;
- b) 20-25 днів.

29. Термін придатності свіжих зелених кормів:

- a) 5-6 днів;
- b) 1-2 дні.

30. Для травоядних тварин взимку основними кормами є:

- a) грубі корми;
- b) соковиті корми;
- c) зелені корми.

31. В організації годівлі екзотичних тварин важливим кормовим засобом у зимовий період, а також резервом корму влітку є:

- a) сіно;
- b) баштанні корми;
- c) сухі віники.

32. Найбільш цінне гірське сіно, в якому переважають:

- a) лікарські рослини;
- b) високий вміст поживних речовин;
- c) вітаміни;
- d) отруйні речовини;
- e) мінеральні речовини.

33. Високий вміст білку і мінеральних речовин має сіно:

- a) червоної конюшини;
- b) люцерни;
- c) баштанні корми.

34. Сіно червоної конюшини і люцерни доцільно згодовувати:

- a) жирафам;
- b) антилопам;
- c) полярним оленям;
- d) мавпам;
- f) тваринам африканського континенту.

35. На корм екзотичним тваринам можна використовувати солому лише:

- a) ячмінну;
- b) гречану;
- c) пшеничну.

36. Сіно, яке пролежало більше року може викликати у екзотичних тварин розлади:

- a) шлунково-кишкового тракту;
- b) розлади серцево-судинної системи.

37. Сіно, що пролежало більше року характеризується:

- a) високими втратами поживних речовин;
- b) запиленістю;
- c) високим вмістом вітамінів;
- d) наявністю сінних кліщів.

38. Екзотичні тварини, які мають підвищену чутливість до дії актиноміцетів:

- a) кенгуру;

- b) птиця;
- c) тапіри.

39. До складу листків сухих віників входять речовини, що мають лікувальні властивості:

- a) алкалоїди;
- b) глікозиди;
- c) ефірні речовини;
- d) дубильні речовини;
- e) вітаміни;
- f) отруйні речовини;
- g) мінеральні речовини.

40. Термін заготівлі віників із листяних дерев:

- a) березень-червень;
- b) квітень-серпень;
- c) червень-жовтень.

41. Шкала кормової цінності сухих віників і зелених гілок за породами дерев має наступну послідовність:

- a) клен;
- b) липа;
- c) ясен;
- d) тополя;
- e) верба;
- f) вільха;
- g) дуб;

h) береза;

j) ялинка.

42. Висушені зелені гілки різних порід дерев і лікарських трав використовують для:

a) виготовлення чаю;

b) виготовлення витяжки.

43. Чай з лікарських рослин можна додавати до:

a) концентрованих кормів;

b) баштанних кормів;

c) у вигляді настою.

44. При розладах шлунку знімає спазми:

a) чай з м'яти;

b) чай з шипшини.

45. При бронхіті використовують:

a) настій з ромашки;

b) настій з шавлії.

46. При запальних процесах, лікуванні ран у якості потогінного засобу використовують:

a) настій з ромашки;

b) настій фенхеля.

47. При здутті шлунку використовують:

- a) настій фенхеля;
- b) настій з ромашки.

48. Овочевий корм сприятливо впливає на:

- a) травлення;
- b) секрецію залоз кишечника;
- c) видільну систему;
- d) мікрофлору кишечника;
- e) серцево-судинну систему;
- f) перистальтику кишечника.

49. Овочі в першу чергу є джерелом:

- a) мінеральних речовин;
- b) білка;
- c) холестерину;
- e) вітамінів.

50. У відповідності з сортовим списком, серед овочевих рослин виділяють:

- a) капустяні;
- b) коренеплідні;
- c) баштанні;
- d) бульбоплідні;
- e) листові;

f) плодові.

51. В овочах мало міститься вітамінів:

- a) групи В;
- b) холестерину.

52. Кормова цінність овочів залежить від їх:

- a) виду;
- b) вмісту поживних і біологічно активних речовин;
- c) частина рослини, яка згодовується;
- d) сезону року.

53. Корми багаті вітаміном С:

- a) петрушка;
- b) перець;
- c) брюсельська капуста;
- d) цвітна капуста;
- e) шпинат;
- f) томати;
- g) кольрабі;
- h) буряк столовий.

54. Корми багаті на каротин:

- a) морква;
- b) петрушка;
- c) салат індивія.

55. Корми багаті кальцієм:

- a) зелені боби;
- b) цибуля порей;
- c) шпинат;
- d) індивія;
- e) шпинат.

56. Корми багаті на фосфор:

- a) горох;
- b) індивія;
- c) петрушка.

57. Корми багаті на залізо:

- a) салат;
- b) хрін;
- c) цибуля порей;
- d) червоноголова капуста.

58. Коренеплідні бульбоплідні овочі, які використовують як соковитий корм у зимовий період:

- a) морква;
- b) столовий буряк;
- c) сіно;
- d) редис;
- e) топінамбур;

- f) солома;
- g) картопля.

59. Є дієтичним кормом, збуджує апетит, покращує травлення:

- a) морква;
- b) солома.

60. Коренебульбоплід, який має послаблюючу дію:

- a) столовий буряк;
- b) сіно;
- c) солома.

61. Картопля містить багато вітаміну:

- a) аскорбінової кислоти (вітамін C);
- b) кальциферолу.

62. Картопля містить мало:

- a) білку;
- b) калію;
- c) вітаміну A;
- d) фосфору.

63. У паростках картоплі міститься отруйний алкалоїд:

- a) соланін;
- b) соматотропін;

с) фенолфталеїн.

64. Цибулинні овочі:

- а) цибуля ріпчаста;
- б) буряк столовий;
- с) сіно;
- д) часник.

65. Цибулинні овочі багаті:

- а) вітаміном В₁;
- б) вітаміном С;
- с) кальцієм;
- д) соланін;
- е) соматотропін;
- ф) протосубтилін;
- г) фосфором;
- h) залізом.

66. При згодовуванні цибулинних овочів у великій кількості тваринам може початися:

- а) запалення слизових оболонок шлунку і кишечника – цибулина анемія;
- б) розлади серцево-судинної системи.

67. Листкові овочі:

- а) салат головчастий;
- б) салат індивії зимовий;

- c) салат індивід літній;
- d) шпинат;
- e) шипшина;
- f) цикорний салат;
- g) петрушка.

68. Плодові овочі:

- a) огірки;
- b) томати;
- c) перець;
- d) шипшина;
- e) дині;
- f) гарбузи;
- g) кавун;
- h) кабачки.

69. Кісткові плоди та ягоди:

- a) вишня;
- b) черешня;
- c) слива;
- d) дині;
- e) абрикос;
- f) персик.

70. До насіннєвих плодів та ягід відносять:

- a) яблука;
- b) груші;

- c) журавлина;
- d) айва.

71. До ягід відносять:

- a) полуниця;
- b) суниця;
- c) малина;
- d) ожина;
- e) виноград;
- f) соняшник;
- g) чорниця;
- h) журавлина;
- j) смородина;
- k) агрус;
- l) шипшина.

72. До південних фруктів відносять:

- a) апельсини;
- b) мандарини;
- c) шипшина;
- d) лимони;
- e) гарбузи.

73. Плоди та ягоди можна згодовувати у вигляді:

- a) сушеному;
- b) свіжозамороженому (з попереднім розмороженням);
- c) тертому;

- d) консервованому;
- e) вареному.

74. В групу горіхів входять:

- a) грецькі горіхи;
- b) лісові горіхи;
- c) кедрові горіхи;
- d) морські горіхи;
- e) арахіс.

75. Всі види горіхів багаті на:

- a) фосфор;
- b) залізо;
- c) холестерин;
- d) вітамін B₁.

76. Насіння соняшнику є гарним кормом для:

- a) птахів;
- b) мавп.

77. Згодовування насіння соняшнику сприяє:

- a) блиску пір'я;
- b) скуповдженню шерсті;
- c) процесу линяння.

78. Сушені жолуді згодовують:

- a) парнокопитним;
- b) морським свинкам;
- c) хом'якам.

79. Мавпи люблять:

- a) макаронні вироби;
- b) сіно;
- c) солома.

80. В асортимент м'ясних кормів, що згодують хижим тваринам входять:

- a) яловичина;
- b) баранина;
- c) конина;
- d) телятина;
- e) сіно;
- f) солома;
- g) м'ясо птиці;
- h) субпродукти (печінка, легені, серце тощо).

81. Хімічний склад і кормова цінність м'яса різна і залежить від:

- a) виду;
- b) віку;
- c) стану здоров'я;
- d) рівня годівлі тварин, що йдуть на корм;
- e) згодовування частини туші.

82. При складанні раціону для хижих тварин необхідно враховувати їх:

- a) фізіологічний стан;
- b) індивідуальні особливості;
- c) особливості утримання;
- d) вікові та статеві відмінності.

83. У годівлі хижих тварин використовують цілі туші таких тварин (так звані кормові тварини):

- a) миші;
- b) пацюки;
- c) свиней;
- d) кролики;
- e) морські свинки;
- f) великої рогатої худоби;
- g) хом'яки.

84. Хімічний склад риби залежить від:

- a) виду;
- b) віку;
- c) особливосте утримання;
- d) пори року, коли її відловлюють;
- e) рівня живлення.

85. Рибу як корм для тварин використовують у вигляді:

- a) свіжому;

- b) тушеному;
- c) пареному;
- d) замороженому.

86. При годівлі звірів рибою з родини тріскових розвивається:

- a) залізодефіцитна анемія;
- b) розлади серцево-судинної системи;
- c) розлади травної системи;
- d) депігментація волосяного покриву.

87. Розроблені і виробляються в Україні і за кордоном повноцінні комбікорми, комбікорми-концентрати та вітамінно-мінеральні премікси для наступних тварин:

- a) фламінго;
- b) журавлів;
- c) страусів;
- d) папуг;
- e) екзотичних птахів;
- f) фазанів;
- g) великої рогатої худоби;
- h) водоплавних та хижих птахів;
- i) парно- і непарнокопитих;
- j) жирафів;
- k) слонів;
- l) носорогів;
- m) мавп;
- n) свиней;
- o) гризунів;

- p) рептилій;
- q) амфібій;
- r) риб;
- s) плазунів;
- t) хижих та водних ссавців (дельфінів, морських левів, тюленів, морських котиків).

88. Для підвищення апетиту сухопутній черепазі влітку згодовують:

- a) полуницю;
- b) сіно;
- c) малину.

89. Для підвищення апетиту сухопутній черепазі взимку згодовують:

- a) яблука;
- b) соломі;
- c) апельсини.

90. Водяній черепазі для підвищення апетиту згодовують:

- a) дощові черв'яки;
- b) буряк кормовий;
- c) мотиль.

91. Об'єм використаної їжі змії залежить від:

- a) віку;
- b) температури навколишнього середовища;
- c) умов утримання;

- d) пори року;
- e) фізіологічного стану.

92. Частота годівлі амфібій:

- a) дрібні щоденно;
- b) тричі на тиждень.

93. Частота годівлі великих жаб, іспанських схованозяберників (китайська і японська саламандри, амфіуми та інші):

- a) через день або два рази на тиждень;
- b) дрібні щоденно.

94. Частота годівлі ящірок рослинно- і всеїдних:

- a) щоденно;
- b) дрібні щоденно.

95. Частота годівлі ящірок м'ясоїдних:

- a) через день або два рази на тиждень;
- b) дрібні щоденно.

96. Раціони для рептилій та амфібій можна складати на:

- a) день чи тиждень;
- b) дрібні щоденно.

97. Частота годівлі молодих змій середніх розмірів:

- a) два рази на тиждень;
- b) дрібні щоденно.

98. Частота годівлі дорослих змій середніх розмірів:

- a) один раз на тиждень;
- b) дрібні щоденно.

99. Частота годівлі молодих пітонів і удавів:

- a) один-два рази на тиждень;
- b) дрібні щоденно.

100. Частота годівлі дорослих пітонів та удавів, а також африканської гадюки роду Bitis:

- a) один раз на три тижні або місяць;
- b) дрібні щоденно.

101. Частота годівлі молодих крокодилів:

- a) щоденно;
- b) дрібні щоденно.

102. Частота годівлі дорослих крокодилів:

- a) два рази на тиждень;
- b) дрібні щоденно.

103. Зміна кількості кормів в раціоні в той чи інший бік, а також заміна кормів здійснюється в залежності від:

- a) сезонної активності;
- b) утримання;
- c) фізіологічного стану.

104. Готові корми для кішок і собак поділяють на:

- a) сухі;
- b) паштети;
- c) вологі.

105. В групу вологих кормів для собак і кішок входять:

- a) паштети;
- b) шматочки в соусі;
- c) сухі;
- d) шматочки з кашами;
- e) вологі;
- f) шматочки з овочами.

106. Незаперечною перевагою готових кормів є:

- a) врахування віку тварини і її розмір;
- b) умов утримання;
- c) збалансованими для того або іншого віку й фізіологічного стану;
- d) збалансовані для тих або інших порід тварин одного виду.

107. За якістю корми поділяють на:

- е) економ клас;
- б) суперклас;
- с) преміям і суперпреміум.

108. Потреба в кормі кішок залежить від:

- а) активності тварин;
- б) засвоєння корму;
- с) фізіологічного стану;
- д) породи;
- е) умов утримання.

109. З якого віку для кошенят можна застосовувати як комбіновану, так і годівлю лише сухим або лише вологим кормом:

- а) двохмісячного;
- б) п'ятимісячного.

110. При неправильному переведенні на новий корм, при передозуванні корму або за відсутності потрібної кількості води у кішок часто спостерігається:

- а) гастроентериту;
- б) панкреатиту.

111. Якщо ваше кошеня живиться сухим кормом, то кількість води має бути у:

- а) три рази більшою, ніж порція корму;

b) дрібні щоденно.

112. Особливе значення для котів має вміст в раціоні:

a) таурин;

b) панкреатин.

113. Частота годівлі кошеняти у віці до трьох місяців на добу:

a) 6 разів;

b) 4-5 разів.

114. Частота годівлі кошеняти у віці з трьох до шести місяців на добу:

a) 4-5 разів;

b) 3 рази.

115. Частота годівлі кошеняти з шести місяців на добу:

a) 3 рази;

b) 6 разів.

116. Дорослих кішок годують на добу:

a) 2 рази;

b) 3 рази.

117. До раціону кішок не можна включати:

a) шоколад;

- b) каву;
- с) алкоголь;
- d) копченості;
- е) м'ясо;
- f) паштети і консерви, призначені для людей;
- g) мариновані продукти;
- h) кондитерські вироби;
- j) варення;
- k) солонина зі спеціями їжа.

118. Значно знижує ризик виникнення сечокам'яної хвороби у кішок суворий контроль вмісту в раціоні:

- a) магнію;
- b) заліза.

119. Зміна кормів у травному тракті відбувається в результаті їх такої обробки:

- a) фізичної;
- b) хімічної;
- с) механічної;
- d) біологічної;
- е) технічної.

120. Потреба собак у поживних речовинах залежить від:

- a) живої маси;
- b) м'язової діяльності;
- с) породи;

- d) росту і розвитку;
- e) фізіологічного стану;
- f) умов утримання.

121. Ознаками задоволення фізіологічних потреб собак в енергії і поживних речовинах є:

- a) нормальний ріст і розвиток молодняку;
- b) постійна маса тіла і середня вгодованість дорослих тварин;
- c) м'язова діяльність;
- d) нормальний життєздатний приплід;
- e) добре здоров'я.

122. Енергія собакам необхідна для:

- a) роботи внутрішніх органів;
- b) нормальної маси тіла;
- c) підтримки тону м'язів і рухів;
- d) нормальної температури тіла.

123. Сумарна кількість органічної речовини (білків, жирів і вуглеводів) для собак виражається в:

- a) кілоджоулях (кДж) валової енергії;
- b) 87 ккал (365 кДж) енергії.

124. Дорослій собаці у стані спокою в середньому потрібно на 1 кг маси тіла:

- a) 87 ккал (365 кДж) енергії;

b) 1 кілоджоуль (кДж) валової енергії.

125. На потребу собак в енергії впливають фактори:

- a) маса тіла;
- b) температура повітря;
- c) стан шерсті;
- d) тонус м'язів;
- e) стать і вік;
- f) конституція і м'язова діяльність (робота службових собак);
- g) фізіологічний стан (вагітність, лактація).

126. Усі собаки різних порід поділяються на категорії:

- a) дуже маленькі – масою тіла від 1 до 5 кг;
- b) маленькі – масою від 5 до 10 кг;
- c) максимальні – від 80 до 90 кг;
- d) середні – масою від 10 до 20 кг;
- e) великі – масою від 20 до 30 кг;
- f) дуже великі – масою від 30 кг і більше.

127. У раціоні племінних собак калорійність підвищують на:

- a) 25%;
- b) 50%.

128. У раціоні вагітних самок калорійність підвищують на:

- a) 50%;
- b) 25%.

129. У раціоні лактуючих самок калорійність підвищують на:

- a) 70% і більше;
- b) 25%.

130. Помірна робота службових собак збільшує витрати енергії в середньому на:

- a) 30%;
- b) 55%.

131. У добовому раціоні службових собак кількість білка повинна становити більше на:

- a) 30 %;
- b) 55 %.

132. Годівля собак тільки вуглеводами через 30-40 діб призводить до:

- a) смерті;
- b) рахіту.

133. При нестачі в раціоні цуценят вітаміну D призводить до:

- a) рахіту;
- b) смерті.

134. У дорослих собак при нестачі в раціоні вітаміну D спостерігається:

- a) остеомаліяція;
- b) рахіт.

135. При хронічній нестачі в раціоні собак вітаміну Е виникає:

- a) м'язова дистрофія;
- b) рахіт.

136. Добова норма м'яса в раціоні собак залежить від:

- a) віку;
- b) статі;
- c) маси тіла;
- d) умов утримання;
- e) фізіологічного стану;
- f) виконуваної роботи.

137. До раціонів при нестачі білка і амінокислот включають:

- a) дріжджі;
- b) казеїнат натрію;
- c) сир;
- d) буряк столовий;
- e) яйця;
- f) синтетичні амінокислоти.

138. При нестачі вітамінів до раціонів собак вводять:

- a) вітамінізовані дріжджі;
- b) сіль кухонну;

- c) вітамінізований риб'ячий жир;
- d) вітамінні препарати.

139. При нестачі в раціонах собак мінеральних елементів до складу раціону включають:

- a) мінеральні добавки;
- b) соломі.

140. Консерви для собак бувають:

141.

- a) м'ясні;
- b) рослинні;
- c) тваринні;
- d) м'ясо-рослинні.

142. Надлишок або нестача необхідних для розвитку і росту компонентів у раціоні собаки призводить до:

- a) порушень обміну речовин;
- b) розладів нервової системи.

143. В даний час випускаються такі основні види кормів для собак:

- a) сухі;
- b) вологі;
- c) напівсухі;
- d) консервовані.

144. Частота годівлі хижих тварин (крім соколів та сов) на тиждень:

- a) 6 днів;
- b) 3 дні.

145. Один з найбільших виробників кормів для екзотичної птиці в Україні:

- a) ТМ Природа;
- b) ТМ Лісоводи.

146. Виробники кормів для екзотичної птиці в Україні:

- a) ТМ «Природа»;
- b) ТМ «Лорд»;
- c) ТМ «Optima»;
- d) ТМ «Лорі»;
- e) Капітан Флінт.

147. Виробники кормів для екзотичної птиці за кордоном:

- a) Versele Laga;
- b) Trill;
- c) Vitakraft;
- d) Verale;
- e) Padovan;
- f) Fiory;
- g) БАК.

148. Птиці необхідно постійно давати для перетирання корму в м'язистому шлунку:

- a) пісок;
- b) сіно.

149. Температура води для птиці в будь-який період року має становити:

- a) 15-18 °C;
- b) 35-40 °C.

150. Папугам в холодну пору року у воду додають:

- a) лимонний сік;
- b) сік з буряка кормового.

151. Основною їжею хижих тварин є:

- a) корми тваринного походження (м'ясо сільськогосподарських та диких тварин);
- b) субпродукти (печінка, серце ті інші);
- c) риба;
- d) сіно;
- e) солома;
- f) молоко;
- g) яйця.

152. Субпродукти у раціони хижих тварин включають від норми м'яса у кількості:

- a) 10%;

b) 55%.

153. Хижим тваринам, крім м'яса до раціонів включають:

- a) хліб;
- b) крупи;
- d) овочі;
- e) силос;
- f) фрукти;
- g) горіхи;
- h) соняшник.

154. Для тварин, які не мають зимового раціону, а також тварин, яких утримують групою, норму м'яса збільшують на:

- a) 25%;
- b) 55%.

155. Наслідком нестачі в раціоні хижих тварин вітамінів А і В в літньо-осінній період може бути:

- a) мала плідність самок;
- b) розлади нервової системи.

156. Важливим джерелом вітамінів для хижих тварин є:

- a) печінка;
- b) силос.

157. Згодовування печінки хижим тварин за 2-3 місяці до гону сприяє:

- a) підвищенню статеві активності і заплідненню самок;
- b) розладам травної системи.

158. Забезпечення хижих тварин вітамінами групи В досягається шляхом згодовування:

- a) печінки з достатньою кількістю кормових дріжджів;
- b) сіна разом здобреного концентрованими кормами.

159. Накопиченню вітаміну А в тілі хижих тварин сприяє підвищене забезпечення тварин:

- a) вітамінами С і Е;
- b) вітаміном С.

160. Самцям хижих тварин корисно згодовувати яйця і мозок, які впливають на:

- a) статеву активність;
- b) травну систему;
- c) якість сперми.

161. Довготривале недогодування самки хижих тварин призводить до:

- a) порушення годівлі плоду (як наслідок загибель або народжується слабкий, хворобливий приплід);
- b) підвищення статеві активності і запліднення самок.

162. Вагітні самки хижих тварин особливо чутливі до нестачі в кормі:

- a) тваринного білка;
- b) холестерину.

163. Малюки у А-авітамінозних самок народжуються:

- a) кволими;
- b) нежиттєздатними;
- c) життєздатними;
- d) сприятливими з перших днів життя до легеневих і кишкових захворювань.

164. Згодовування об'ємистих кормів у період вагітності самок хижих тварин викликають:

- a) запор і бродіння;
- b) розлади нервової системи.

165. У період вагітності самкам хижих тварин краще круп'яні каші замінити на:

- a) сухарі або хліб;
- b) баштанні корми.

166. В другу половину вагітності годівля самок хижих тварин:

- a) триразова;
- b) дворазова.

167. Згодовування вагітним самкам хижих тварин недоброякісних кормів призводить до:

- a) харчових отруєнь і абортів;
- b) нервових розладів.

168. Добру дію на молочність самок хижих тварин мають такі корми:

- a) печінка;
- b) сіно;
- c) молоко;
- d) серце;
- e) нирки.

169. Джерелом вітамінів А і D для хижих тварин є:

- a) печінка;
- b) селезінка;
- c) молоко;
- d) риб'ячий жир.

170. Для попередження авітамінозу В лактуючим самкам слід регулярно згодовувати:

- a) кормові дріжджі;
- b) молоко;
- c) зелень або спеціалізовані комплекси вітамінних добавок.

171. Використання в годівлі молодняку хижих тварин недоброякісних кормів викликає:

- a) шлунково-кишкові хвороби;

- b) розлади нервової системи;
- c) затримує ріст і розвиток.

172. До складу раціонів усіх видів гризунів повинні входити:

- a) соковиті;
- b) кормові дріжджі;
- c) зернові та корми тваринного походження (сир, яйця, кісткове борошно).

173. Для розведення жиророзчинних вітамінів, які використовують при годівлі гризунів, необхідно мати на місяць:

- a) літр рослинної олії;
- b) дистильовану воду.

174. Рівень кормів в раціонах для дресированих і одомашнених тварин змінюється в залежності від:

- a) інтенсивності роботи;
- b) умов утримання;
- c) кількості виступів;
- d) фізіологічного стану;
- e) індивідуальної переваги одних кормів над іншими та їх кількості;
- f) індивідуальних особливостей кожної тварини.

175. Кратність годівлі мавп взимку:

- a) тричі;
- b) двічі.

176. Кратність годівлі мавп влітку, разів:

- a) чотири;
- b) два.

177. Для профілактики вірусних захворювань до раціону мавп включають:

- a) часник;
- b) моркву.

178. Основним кормом морських свинок є:

- a) якісне сіно;
- b) гарбузи;
- c) зернові корми або комбікорми.

179. Кратність згодовування зернових кормів морським свинкам на добу:

- a) двічі;
- b) тричі.

180. Кратність годівлі вагітних і лактуючих самок морських свинок на добу, разів:

- a) 3-4;
- b) 6-7.

181. До раціонів морських свинок не можна включати:

- a) картоплю;
- b) сіно;
- c) цибулю;
- d) боби.

182. Особливістю організму морських свинок є те, що в ньому не виробляється:

- a) аскорбінова кислота;
- b) тиамін.

183. Морська свинка на добу повинна споживати вітаміну С не менше:

- a) 20 мг;
- b) 55 мг.

184. Найкращим кормом для годівлі личинок бліх у лабораторії є:

- a) суха кров розтерта в порошок;
- b) плазма крові.

185. До раціону лабораторних пацюків включають:

- a) зернову суміш;
- b) овочі;
- c) кавуни;
- d) фрукти;
- e) зелень.

186. Корми тваринного походження до раціону лабораторних пацюків включають на тиждень:

- a) двічі;
- b) тричі.

187. Температура води для лабораторних пацюків:

- a) 18-20 °C;
- b) 15-20 °C.

188. Кальцій і фосфор у раціонах пацюків і мишей знаходиться у співвідношенні:

- a) 1,5:1;
- b) 3-5:1.

189. Оптимальне співвідношення калію і натрію в раціонах пацюків і мишей:

- a) 3-5:1;
- b) 1,5:1.

190. Співвідношення азоту і сірки в раціонах пацюків і мишей повинно знаходитися на рівні:

- a) 12-20:1;
- b) 1,5:1.

191. Для годівлі пацюків і мишей використовують молоко тільки:

- a) пастеризоване або кип'ячене;
- b) мариноване.

192. Режим годівлі пацюків і мишей:

- a) дворазовий;
- b) триразовий.

193. Вагітних самок пацюків і мишей годують на добу:

- a) 3-4 рази;
- b) 5-6 разів.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of standard notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings present.

Навчально-методичне видання

ЄВСТАФІЄВА Юлія Миколаївна

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
з дисципліни
«ГОДІВЛЯ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН»

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Н2
Тваринництво освітньо-професійна програма «Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва» (204 «Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва»)

Друк трафаретний.
Папір офсетний. Тираж 30. Гарнітура Таймс.
Ум. друк. арк. 2,16.

Оригінал-макет – кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва,
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», вул. Шевченка, 12